

Рекомендовані тексти диктантів:

Навіщо потрібна вакцинація?

Проведення вакцинації вважається одним із найбільш ефективних та економічно доцільних медичних заходів, що проводиться з метою недопущення поширення багатьох інфекційних захворювань, які існують на теперішній час.

Завдяки імунізації, запровадженій Всесвітньою організацією охорони здоров'я у 1967-1977 роках, було ліквідовано натуральну віспу. До вакцинації хвороба загрожувала більшій частині населення світу, від неї помирав кожний четвертий хворий.

Уже в наш час з успіхом були ліквідовані такі страшні інфекційні хвороби, як дифтерія та поліомієліт. Планові щеплення проти поліомієліту, правця, дифтерії та кашлюка щорічно рятують життя сотням тисяч людей по всьому світі. Мільйони людей звільнені від страждань, пов'язаних із тяжкими хворобами та інвалідністю.

У нашій країні вакцинація проводиться відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень. В обов'язковому порядку проводиться імунізація проти десяти інфекційних захворювань: туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця, вірусного гепатиту Б, кору, краснухи, епідемічного паротиту, гемофільної інфекції.

Окрім обов'язкових, існують ще так звані рекомендовані щеплення проти деяких інших інфекційних хвороб, які легко поширюються і можуть призвести до важких наслідків. Це щеплення від грипу, гепатиту А, вітряної віспи, ротавірусної, пневмококової, менінгококової та папіломавірусної інфекції.

Вакцинуватися потрібно, щоб захистити себе та тих, хто навколо нас. Не всі можуть бути вакциновані, зокрема ті, хто серйозно хворий. Вони залежні від того, хто щеплений. Слід пам'ятати: здорове суспільство залежить від свідомого ставлення кожного з нас не тільки до власного здоров'я чи здоров'я своїх близьких, а й до безпеки оточуючих. Бережіть здоров'я з молодю!

Як захистити себе від дифтерії

Дифтерія - тяжке інфекційне захворювання. Збудником є мікроб - дифтерійна паличка. При дифтерії виникає запалення дихальних шляхів. Джерелом інфекції є хвора людина. Дифтерія розповсюджується при кашлі, чханні, розмові, а також через забруднений посуд, рушники, іграшки.

Основним засобом попередження дифтерії є профілактичні щеплення. В день проведення вакцинації дітей та дорослих обов'язково має оглянути лікар.

Своєчасно отримані профілактичні щеплення захистять вас від дифтерії!

Обережно, кір!

Кір – гостре інфекційне захворювання, яке легко та швидко передається повітряно-крапельним шляхом. Захворювання розпочинається з підвищення температури тіла, з'являється нежить, сухий кашель, кон'юнктивіт, починається період висипань. Він небезпечний тим, що може ускладнитися пневмонією чи викликати ураження головного мозку.

На вірус кору не діють жодні медикаменти. Єдиний метод попередити захворювання – це вакцинація.

При появі перших симптомів (підвищення температури тіла, біль в горлі, нежить, кашель), залишатись вдома та звернутись до свого сімейного лікаря, для отримання кваліфікованої допомоги та встановлення діагнозу.

Давайте будемо відповідальними за власне здоров'я та здоров'я оточуючих!

Кір – інфекційне захворювання

Кір – це надзвичайно заразне гостре вірусне інфекційне захворювання. Джерелом збудника інфекції є хвора на кір людина. Зараження відбувається через вдихання повітря найдрібніших крапель слизу, які потрапили в повітря при чханні, кашлі або розмові хворої на кір людини.

Початок захворювання гострий. У період захворювання починається висока температура, сильний головний біль, нежить, відсутність апетиту і слабкість. Потім з'являється сухий кашель, кон'юктивіт, сльозотеча. Часто ці симптоми можна сплутати зі звичайною застудою чи грипом. На другий-третій день хвороби з'являються рожеві крапкові висипання. Основним способом профілактики цієї інфекції є вакцинація.

При перших симптомах захворювання негайно звертайтеся до лікаря!

Кашлюк – вкрай заразне захворювання дихальних шляхів.

Найбільш характерною ознакою кашлюка є затяжний кашель. Хвороба легко поширюється від людини до людини, головним чином повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні. Багато дітей, інфікованих кашлюком, страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Найбільш небезпечно це захворювання для немовлят.

У немовлят кашлюк може супроводжуватися тимчасовим припиненням дихальних рухів. Пневмонія є досить поширеним ускладненням від кашлюку. Рідше виникають конвульсії й ураження головного мозку. Щеплення проти кашлюка входить до Національного календаря профілактичних щеплень. Вакцини закупаються державним коштом, отже щепити дитину можна безоплатно в медичному закладі.